
Recomendaciones antes de una intervención quirúrgica - PEDIATRÍA

Información para los padres antes de una intervención quirúrgica

Apreciado/a Sr./a.,

A su hijo/a se le practicará una intervención que debe realizarse en el quirófano y requiere la administración de anestesia.

Para que la intervención se haga en las condiciones adecuadas y para evitar complicaciones, deben seguir las recomendaciones que les hacemos a continuación.

Preparación antes de una intervención

- Si ustedes observan que su hijo/a está enfermo, y sobre todo si tiene fiebre dos semanas antes de la intervención, pónganse en contacto con el Servicio de Programación.
- El niño/a no debe tomar ibuprofeno al menos 5 días antes de la operación, ya que puede alterar la coagulación sanguínea.
- Es posible que lo llamen desde el hospital 2-3 días antes para asegurar que toda la información es correcta.

Ayuno

	SÓLIDOS	LECHE DE FÓRMULA	LECHE MATERNA (incluida la fortificada)	AGUA o AGUA CON AZÚCAR
NO COMER ANTES DE LA INTERVENCIÓN	6 h ANTES	4 h ANTES	3 h ANTES	1 h ANTES

Higiene:

- Es aconsejable ducharse y lavarse el cabello antes de venir al hospital.
- Traer ropa y calzado cómodo y algún juguete con el que se pueda distraer.
- No hay que llevar maquillaje, ni esmalte de uñas, ni traer joyas ni piercings.

Acompañantes:

- No es aconsejable que vengan más de dos personas con el niño/a.
- Recuerden que necesitan un medio de transporte. Se recomienda no utilizar transporte colectivo.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y SU CONFIANZA EN NUESTROS SERVICIOS

Recomanacions abans d'una intervenció quirúrgica - PEDIATRIA

Informació per als pares abans d'una intervenció quirúrgica

Benvolgut/da Sr./a.,

Al seu fill/a se li practicarà una intervenció que s'ha de realitzar al quiròfan i requereix l'administració d'anestèsia.

Perquè la intervenció es faci en les condicions adequades i per evitar complicacions, han de seguir les recomanacions que els fem a continuació.

Preparació abans d'una intervenció

- Si vostès observen que el seu fill/a està malalt, i sobretot si té febre dues setmanes abans de la intervenció, posin-se en contacte amb el Servei de Programació.
- El nen/a no ha de prendre ibuprofè a l'almenys 5 dies abans de l'operació, ja que pot alterar la coagulació sanguínia.
- És possible que truquin des de l'hospital 2-3 dies abans per assegurar que tota la informació és correcta.

Dejuni

	SÒLIDS	LLET DE FÒRMULA	LLET MATERNA (inclosa la fortificada)	AIGUA o AIGUA AMB SUCRE
NO MENJAR ABANS DE LA INTERVENCIÓ	6 h ABANS	4 h ABANS	3 h ABANS	1 h ABANS

Higiene

- És aconsellable dutxar-se i rentar-se el cabell abans de venir a l'hospital.
- Portar roba i calçat còmode i alguna joguina amb que es pugui distreure.
- No s'ha de portar maquillatge, ni esmalt d'ungles, ni portar joies ni pírcings.

Acompanyants

- No és aconsellable que vinguin més de dues persones amb el nen/a.
- Recordin que necessiten un mitjà de transport. Es recomana no utilitzar transport col·lectiu.

GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ I LA SEVA CONFIANÇA EN ELS NOSTRES SERVEIS