



SOLUCIÓ EVACUANT PER A COLONOSCÒPIES

PLEINVUE®

PROVA TARDA

La caixa de Pleinvue® conté **3 sobres**:



On recollir el Pleinvue®

Si la prova l'ha programat el **metge o la metgessa del CAP**, l'has de **recollir al CAP**.

Si la prova l'ha programat un **especialista de l'hospital**, l'has de **recollir a l'hospital**.

(Edifici Taulí, planta baixa, al taulell d'informació, de 8 a 20h, de dilluns a divendres, no cal agafar tiquet)


Quan prendre les dosis

Si tens la prova a la **TARDA** (de 15:00 a 20:00h)

- La **DOSI 1** es prendrà 7 hores abans de la prova.
- La **DOSI 2** es prendrà 4 hores abans de la prova.
- **No beure res** 2 hores abans de la prova.

Per exemple, si la prova és a les **17:00h**:

- **DOSI 1**: a les **10:00h**.
- **DOSI 2**: a les **13:00h**.
- **No beure res** a partir de les **15:00h**.



Com prendre les dosis



És important seguir aquestes pautes per evitar nàusees i vòmits

DOSI 1

7 HORES ABANS



1. Dissoldre el sobre de la DOSI 1 en **500 ml** (mig litre) d'**aigua freda**.



2. Prendre **un got** de la dosi **cada 15 minuts**, fins que s'acabi.

3. Quan s'acabi, esperar **10 minuts** i beure **500 ml d'aigua normal o de líquids clars**.

DOSI 2

4 HORES ABANS



1. Dissoldre els sobres A i B de la DOSI 2 en **500 ml** (mig litre) d'**aigua freda** i repartir en **4 gots**.

2. Repartir **500 ml d'aigua normal** en **4 gots** més.



3. Lentament, prendre **1 got cada 15 minuts**, **alternant dosi i aigua**, fins acabar els 8 gots.

