

## PAUTES D'ACTUACIÓ EN PACIENTS EN MESURES D'AÏLLAMENT DE CONTACTE I GOTES PER ENTEROVIRUS EN POBLACIÓ PEDIÀTRICA



- Abans/després del contacte amb el pacient amb solució alcohòlica.
- Abans i després d'entrar/sortir de l'habitació amb solució alcohòlica.




- Abans d'entrar a l'habitació i recanviar entre procediments en el mateix pacient. Higiene de mans amb solució alcohòlica en recanviar els guants.



- Abans d'entrar a l'habitació i retirar al sortir.



- Abans d'entrar a l'habitació **mascareta quirúrgica** ben ajustada i retirar al sortir.



- Habitació individual i evitar al màxim els trasllats. La porta de l'habitació romandrà tancada.



- Durant trasllats el pacients portarà mascareta quirúrgica.



- D'ús exclusiu: Material d'higiene, fonendoscopi, refo (aparell i bolígraf) i esfigmomanòmetre. Descontaminar diàriament amb alcohol 70° i a l'alta veure manual de procediments.
- D'ús compartit: Lliteres, cadires i aparell RX descontaminar després d'utilitzar amb lleixiu 1%.
- Roba bruta: Bossa blanca; Deixalles: bossa negra i tancar a l'habitació.



- Visites restringides i informar de les mesures.
- Higiene de mans a l' entrar i sortir de l'habitació amb solució alcohòlica.
- Evitar contacte estret amb persones que presentin o hagin presentat clínica de virasis (exantema, febre, quadre catarral...) la setmana prèvia al contacte.



- Durada de les precaucions d'aïllament:
  - 2 setmanes precaucions de gotes (previ control faringi negatiu)
  - 8 setmanes precaucions de contacte

Ordre de col·locació i retirada de l'equip de protecció

Entrada



Sortida

